



وزارت بهداشت و آموزش پزشکی
بیمارستان شهید هاشمی نژاد

آموزش به بیمار

داروهای رقیق کننده خون آپیکسابان



بیمارستان آموزشی، پژوهشی،
درمانی شهید هاشمی نژاد مشهد
واحد آموزش به بیمار

● خونریزی شدید در دوران قاعدگی

● سردرد، گیجی، ضعف، احساس اینکه هر لحظه

ممکن است بیفتید.

● ادراری که به نظر قرمز، صورتی یا قهوه ای می رسد.

● مدفوع سیاه یا خونی

سرفه صورتی رنگ استفرافی که شبیه دانه های قهوه
باشد



منبع: <http://medlineplus.gov/druginfo>

مشهد، طلاب، انتهای بلوار ابوریحان، بیمارستان شهید هاشمی نژاد

تلفن: ۱۵-۱۱-۲۷۳۷۰۱۳ ۰۵۱۳ داخلی بخش قلب ۲۳۳۲

سایت بیمارستان: hasheminejad.mums.ac.ir

کلینیک پرستاری آموزش سلامت واقع در کلینیک تخصصی همه
روزه به جز ایام تعطیل از ساعت ۸ الی ۱۲ پاسخگوی سوالات شما می
باشد تلفن داخلی کلینیک ۸۰۰۳ می باشد.
جهت دریافت محتوای آموزشی بارکد زیر را اسکن کنید.



در آپارات ما را
دنبال کنید



- در زمان مصرف آپیکسابان از بروز ضربات مهم به بدن جلوگیری نمایید.
- از مصرف داروهای ناشناس، گیاهی و خودسرانه پرهیز نمایید و داروهای تجویز شده را به پزشک معالج اطلاع دهید.
- این دارو را در ظرفی که در آن محکم بسته و دور از دسترس کودکان، نگهداری کنید. آن را در دمای اتاق و دور از نور، گرما و رطوبت اضافی نگهداری کنید.

علائم و نشانه های خطر در صورت مصرف آپیکسابان چیست؟

- در صورت مشاهده هر کدام از علائم زیر با پزشک خود و یا اورژانس تماس بگیرید:
- به راحتی کبود شدن، خونریزی غیر طبیعی (از دهان، بینی، واژن یا مقعد)، خونریزی از زخم و جراحت و یا تزریق سوزنی، هر گونه خونریزی که بند نیاید.




باید دقت شود در ورزش از پوشش های حفاظتی مانند زانوبند، جوراب، کفش و کلاه ایمنی استفاده شود.

داروی آپیکسابان چیست؟

این دارو رقیق کننده خون است و مانع از تشکیل لخته شدن خون می شود. دارو به شکل قرصهای ۲/۵ و ۵ میلی گرم موجود می باشد. این دارو برای جلوگیری از سکتة مغزی یا لخته شدن خون در افرادی که ضربان قلب نامنظم دارند و یا افزایش احتمال سکتة مغزی که ناشی از بیماری دریچه قلب نیست، استفاده می شود. همچنین برای جلوگیری از لخته شدن خون در رگ های عمقی در ساق پا و ویا لخته خون در ریه (آمبولی ریه) و در افرادی که تحت جراحی تعویض مفصل ران یا تعویض زانو هستند، استفاده می شود.

داروی آپیکسابان چه زمانی مصرف شود؟

- این دارو معمولا هر ۱۲ ساعت یعنی دوبار در روز مصرف می شود.
- می توانید دارو را همراه غذا یا بدون آن، مصرف نمایید.
- برای اینکه نتیجهی بهتری از مصرف این دارو بگیرید؛ آن را به صورت منظم مصرف نمایید.
- حتما دارو را هر روز سر ساعت مشخص مصرف نمایید.



در صورت فراموش کردن یک نوبت دارو چکار کنیم؟

- به محض به خاطر آوردن دوز فراموش شده، هر چه سریعتر آن را مصرف کنید؛ مگر آنکه زمان مصرف دوز بعدی فرا رسیده باشد.
- در صورت فراموش کردن یک دوز دارو، از دو برابر کردن آن در وعده بعدی خودداری کنید و پس از آن داروی خود را به صورت طبیعی مصرف نمایید.

آپیکسابان با کدام داروها تداخل دارد؟

- مصرف داروی آپیکسابان با داروهای ضد تشنج، منع مصرف دارد.
- مصرف همزمان این دارو با داروهای ضد انعقاد خون یا ضد پلاکت مانند وارفارین، هپارین، آسپرین و داروهای ضد التهابی غیر استروئیدی مانند ایبوپروفن یا ناپروکسن می توانند خطر خونریزی داخلی را در شما افزایش دهند
- داروهایی نظیر کتوکونازول و ایتراکونازول میزان اثر آپیکسابان را در بدن شما افزایش می دهند.
- داروهای ریفامپین، کاربامازپین و فنی توئین میزان اثر آپیکسابان را در بدن شما کاهش می دهند.
- گریپفروت ممکن است با داروی آپیکسابان تداخل داشته و منجر به عوارض جانبی ناخواسته در فرد شود.



هنگام مصرف داروی آپیکسابان چه مراقبتها و توجهاتی لازم است؟

- چنانچه بیشتر از میزان مورد نیاز، این دارو را مصرف کردید؛ از پزشک کمک بگیرید.
- به محض بروز واکنش های آلرژیک یا کبودیهای ناخواسته از مصرف این دارو اجتناب کنید.
- بیماران با خونریزی داخلی و رقت خون یا کسانی که قصد جراحی دارند (از حداقل ۲۴ تا ۴۸ ساعت قبل)، نباید این دارو را مصرف کنند.
- در صورتی که دارای مشکلات قلبی و عروقی، کبدی و کلیوی هستید؛ حتما به پزشک خود اطلاع دهید. با افزایش سن، بدن شما ممکن است مانند گذشته این دارو را تجزیه نکند که می تواند خطر عوارض جانبی آن را افزایش دهد.
- در مادر باردار و شیرده و وزن کمتر از ۵۰ و بیشتر از ۱۲۰ کیلوگرم، آپیکسابان داده نمی شود
- اگر قصد جراحی یا انجام اقدامات پزشکی یادداند پزشکی دارید؛ به پزشک یا دندانپزشک خود بگویید که از داروی آپیکسابان استفاده می کنید.
- در صورتی که برای بلعیدن قرص مشکل دارید، می توانید قرص آپیکسابان را خرد کرده و با مقداری آب یا آب سیب مخلوط کنید و فوراً آن را بخورید.
- آپیکسابان از انعقاد طبیعی خون جلوگیری کرده و به همین دلیل خونریزی دیرتر متوقف می شود؛ این دارو می تواند بروز کبودی یا خونریزی را آسانتر کند

