



دانشگاه علوم پزشکی شهید
بیمارستان شهید هاشمی نژاد

آموزش به بیمار

داروهای رقیق کننده خون ریواروکسابان



بیمارستان آموزشی، پژوهشی،
درمانی شهید هاشمی نژاد مشهد
واحد آموزش به بیمار

این دارو را در ظرفی که در آن آمده، محکم بسته و دور از دسترس کودکان نگهداری کنید. آن را در دمای اتاق و به دور از گرما و رطوبت اضافی نگهداری کنید.

برخلاف وارفارین آزمایش خونی (PT, INR) برای پیگیری میزان اثربخشی این دارو لازم نیست.



منبع: <http://medlineplus.gov/druginfo>
مشهد، طلاب، انتهای بلوار ابوریحان، بیمارستان شهید هاشمی
تژاد تلفن: ۱۵-۱۱۰۲۷۳۷۰۵۱۳ داخلی بخش قلب ۲۳۳۲

سایت بیمارستان: hasheminejad.mums.ac.ir
کلینیک پرستاری آموزش سلامت واقع در کلینیک تخصصی
همه روزه به جز ایام تعطیل از ساعت ۸ الی ۱۲ پاسخگوی
سوالات شما می باشد تلفن داخلی کلینیک ۸۰۰۳ می باشد.
جهت دریافت محتوای آموزشی بارکد زیر را اسکن کنید.




در آپارات مارا
دنبال کنید



علائم و نشانه های خطر در صورت مصرف ریواروکسابان چیست؟

در صورت مشاهده هر کدام از علائم زیر با پزشک خود و یا اورژانس تماس بگیرید:

- مهم ترین عارضه ریواروکسابان خونریزی است. هرگونه علائم خونریزی (استفراغ خونی، وجود خون در ادرار، مدفوع یا خلط، خونریزی لثه، خونریزی غیر طبیعی رحمی، کبودی و کوفتگی بی دلیل)
- تغییرات غیر طبیعی در آزمایشات دوره های (آزمایشاتی که جهت بررسی فاکتورهای انعقادی خون توسط پزشک تجویز می شود)
- افزایش درجه حرارت بدن (تب)، ورم ناحیه پا یا مچ، بروز لکه های قرمز پوستی و خارش
- در صورت داشتن تهوع، سوء هاضمه و درد معده، از مصرف غذاهای پرچرب و پرادویه خودداری نموده و حتما دارو را پس از غذا مصرف کنید.
- در صورت احساس سرگیجه، خستگی یا از حال رفتن، از رانندگی و کار با ابزاری که نیاز به تمرکز دارند، خودداری نمایید.



هنگام مصرف داروی ریواروکسaban چه مراقبت‌ها و توجهاتی لازم است؟

چنانچه هرکدام از شرایط زیر را دارید به پزشک
معالج خود که داروی ریواروکسaban را برای شما تجویز
نموده اطلاع دهید:

۱. اگر قبلاً سابقه بیماری یا جراحی نظیر عمل
تعویض دریچه قلب، خونریزی غیرمعمول یا اختلال
خونریزی، بیماری کلیوی یا کبدی داشته‌اید.

۲. اگر باردار هستید یا قصد باردار شدن دارید یا
هنگام مصرف ریواروکسaban باردار شدید و یا شیرده
هستید.

۳. چنانچه عمل جراحی از جمله جراحی دندان در
پیش دارید؛ به پزشک یا دندانپزشک بگویید که
داروی ریواروکسaban مصرف می‌کنید.


۴. اگر قادر به بلع کامل قرص نیستید، می‌توانید
قرص را خرد کرده و با مقدار کمی پوره سیب مخلوط
نمایید و حتماً بلافاصله بعد از غذا میل نمایید.

۵. اگر NGT یا همان لوله بینی معده ای دارید؛ پیش
از وارد کردن قرص به لوله تغذیه، می‌توانید قرص را
خرد کرده و در ۵۰ میلی لیتر آب حل نمایید.

۶. داروی ریواروکسaban اعتیاد آور نیست؛ اما قطع
ناگهانی آن می‌تواند مشکلاتی مانند خطر ایجاد لخته
خون، خونریزی و یا حتی مرگ را افزایش دهد.

ریواروکسaban با کدام داروها تداخل دارد؟

- ◆ به دلیل اینکه داروی ریواروکسaban با داروهای زیادی
تداخل دارد؛ در صورت نیاز به مصرف داروی دیگر
بخصوص داروهای زیر، حتماً به پزشک معالج اطلاع
دهید:
- ◆ داروی آسپرین و همچنین داروهای رقیق‌کننده خون
- ◆ مانند وارفارین و انوکسپارین به دلیل افزایش خطر
خونریزی
- ◆ برخی از داروهای ضد افسردگی (مانند فلوکستین،
دولوکستین)
- ◆ داروهای درمان تشنج (مانند کاربامازپین، فنی‌توئین،
فنوباریتال)
- ◆ داروهای درمان قارچ (مانند کتوکنازول)
- ◆ برخی داروهای درمان سل (مانند ریفامپین)



داروی ریواروکسaban چیست؟

ریواروکسaban یک داروی ضد انعقاد است که با
پیشگیری از تشکیل لخته خون، از بروز انسداد عروق و
عوارض ناشی از آن جلوگیری می‌نماید.

لخته‌های خون می‌توانند در سیاهرگ‌های ناحیه پا،
ریه، مغز یا قلب تشکیل گردند و باعث جلوگیری از
خون‌رسانی مناسب به این نواحی شوند. این دارو به
شکل قرص خوراکی و در ۴ دوز (۲/۵، ۱۰، ۱۵ و
۲۰ میلی گرم موجود می‌باشد).

داروی ریواروکسaban چه زمانی مصرف شود؟

ریواروکسaban یک بار در روز مصرف می‌شود. حتماً
این دارو همراه با غذا (معده پر) مصرف شود.

در صورت فراموش کردن یک نوبت دارو چکار کنیم؟

- ◆ اگر یک نوبت داروی ریواروکسaban را فراموش
کردید، بلافاصله آن را مصرف کنید.
- ◆ اما اگر نزدیک به زمان دوز بعدی، به یاد آوردید
که دارو را مصرف نکرده‌اید؛ نیازی به مصرف دو
برابر داروی ریواروکسaban نیست و فقط دوز مقرر
را مصرف کنید.

