



وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
بیمارستان شهید هاشمی نژاد

آموزش به بیمار

انواع روش های بیهوشی




بیمارستان آموزشی، پژوهشی،
درمانی شهید هاشمی نژاد مشهد
واحد آموزش به بیمار

توجهات بعد بی حسی اسپینال:

استراحت در بستر، خوردن مایعات زیاد، عدم زور زدن
، رعایت بهداشت فردی

۳- بی حسی موضعی

بر حسب موضع ونوع عمل جراحی، پزشک بیهوشی شما
اعصاب آن قسمت را بی حس می نماید.



با آرزوی سلامتی برای شما مددجوی عزیز

منبع: WWW.medlineplus.com

مشهد، طلاب، انتهای بلوار ابوریحان، بیمارستان شهید هاشمی
نژاد تلفن: ۱۵-۱۱-۲۷۳۷۰۰۵۱۳ یا با شماره ۳۱۰۹ تماس
بگیرید.

سایت بیمارستان: hasheminejad.mums.ac.ir

کلینیک پرستاری آموزش سلامت واقع در کلینیک تخصصی همه
روزه به جز ایام تعطیل از ساعت ۸ الی ۱۲ پاسخگوی سوالات
شما می باشد تلفن داخلی کلینیک ۸۰۰۳ می باشد. جهت
دریافت پمفلت های آموزشی بارکد زیر را اسکن کنید.




در آپارات ما را
دنبال کنید

به این ترتیب اعصاب بدن در ناحیه کمر و اطراف آن
دچار بی حسی می شود بنابراین از این روش می توان
برای انجام اعمال جراحی اطراف و داخل شکم، اندام های
تحتانی، پاها و لگن استفاده کرد.
در این روش بیمار حس و حرکت طبیعی خود را بعد از
عمل و طی گذشت زمانی کوتاه به دست می آورد.

قبل از بی حسی اسپینال (بی حسی کمر):

حمام کردن در روز قبل از عمل برای کنترل عفونت
مفید می باشد.



مطالب پیش رو ، محتوی مطالب آموزشی برای آشنایی شما از روش های بیهوشی می باشد تا با توکل برخداوند، عمل جراحی خوبی را پشت سر بگذارید.



حرف از عمل **جراحی** که به میان می آید یکی از اولین نگرانی هایی که ذهن بیماران را درگیر می کند مسئله بیهوشی، بی حسی و درد است! در این مواقع بیشتر افراد بیهوشی عمومی را ترجیح می دهند چرا که نمی خواهند هیچ تجربه ای از اتاق عمل داشته باشند اما در عین حال گروهی هم نگران عوارض احتمالی بیهوشی هستند و ترجیح می دهند در اتاق عمل بیدار باشند و باید بدانید که در انتخاب نوع بیهوشی یا بی حسی ، بسته به موضع عمل ، شرایط جسمی بیمار ، انتخاب بیمار و نظر متخصص بیهوشی می تواند تاثیر گذار باشد.



توجهات مهم قبل از بیهوشی یا بی حسی :

۱-بهبتر است حداقل ۸ ساعت قبل از عمل چیزی نخورید.البته در صورت استفاده از داروهای خاص نسبت به ادامه مصرف آن حتما از پزشک معالج سوال شود.

۲-قبل از هرگونه عمل جراحی در صورت مصرف هرگونه داروی خاص ،خصوصا آسپرین، وارفارین و و یا بیماری هایی مانند سرما خوردگی ،آسم و یا سایر بیماریهای تنفسی ، قلبی یا فشار خون وقند خون و... حتما پزشک و پرستار خود را مطلع نمایید. و همچنین در صورت داشتن دندان لق یا سایر مشکلات مربوط به دهان(شکستگی های قدیمی در فک و صورت) یا سابقه داشتن بیهوشی طولانی و سخت، حتما پزشک بیهوشی و یا کارشناس بیهوشی خودرا مطلع نمایید.

۳-پاک کردن لاک ناخن ها ودر آوردن کلیه زیور آلات و اجسام فلزی و دندان مصنوعی

چند نوع بیهوشی داریم؟۳ روش وجود دارد .

۱- روش بیهوشی کلی یا عمومی :

طی آن بیمار با کمک ترکیبی از داروها بیهوش می شود. در این روش بیمار متوجه هیچ چیز نمی شود یعنی پیش از انجام جراحی به خواب می رود و بعد از پایان عمل بیدار می شود .و اینکه عمل جراحی هرقدر هم طول بکشد بیمار متوجه چیزی نمی شود و برای بیمار مانند یک لحظه می گذرد .

اتاق ریکاوری:

بعد از اتمام عمل جراحی بیمار مدتی در اتاق ریکاوری که در مجموعه اتاق های عمل است مانده تا تاثیر داروهای بیهوشی یا بیحسی بتدریج کم شده و وضعیت دستگاه های حیاتی بدن بخصوص دستگاه قلب و عروق و دستگاه تنفسی به وضع عادی برگردد.



۲- بی حسی نخاعی:

یا اطراف نخاعی (اسپاینال یا اپیدورال) است که طی آن بیمار بیهوش نمی شود و با تزریق داروهای بی حس کننده موضعی در انتهای کانال نخاعی (جایی که دیگر نخاع وجود ندارد) بی دردی و بی حسی ایجاد می شود.