




وزارت بهداشت و آموزش پزشکی
بیمارستان شهید هاشمی نژاد

آموزش به بیمار

هیدروسفالی در نوزادان



مرکز آموزشی پژوهشی
درمانی شهید هاشمی نژاد
واحد آموزش به بیمار

چه زمان باید سریعاً به پزشک مراجعه کرد؟

مشکلات شنت : گاهی اوقات ممکن است کارکرد شنت متوقف شود ، در اینصورت کودک ناگهان بیمار می شود.

علائم توقف عملکرد شنت:

شامل تب، سردرد یا استفراغ، تشنج و توقف در رشد می باشند. اگر این علائم در حال پیشرفت باشد، باید سریعاً به پزشک مراجعه شود .



منبع: <https://medlineplus.gov>

مشهد، طلاب، انتهای بلوار ابوریحان، بیمارستان شهید هاشمی نژاد،
تلفن: ۰۵۱۳ ۲۷۳۷۰۱۱-۱۵ و یا با شماره ۳۱۰۹
شماره داخلی NICU: ۲۲۲۲ شماره داخلی بخش اطفال: ۲۲۳۳
تماس بگیرید.

سایت بیمارستان: hasheminejad.mums.ac.ir

کلینیک پرستاری آموزش سلامت واقع در کلینیک تخصصی همه روزه
به جز ایام تعطیل از ساعت ۸ الی ۱۲ پاسخگوی سوالات شما می
باشد تلفن داخلی کلینیک ۸۰۰۳ می باشد. جهت دریافت پمفلت های
آموزشی بارکد زیر را اسکن کنید.




درمان هیدروسفالی :

در موارد خفیف بیماری ، ترکیبات دارویی موجب کاهش مایع مغزی نخاعی می شود . کاربردی ترین روش درمان ، قرار دادن شنت (لوله ای ضعیف) در جمجمه است . که مایع اضافی را از مغز به حفره دیگری در بدن منتقل می کند. و به این ترتیب سر به تدریج به حالت طبیعی بر میگردد .

درمان توانبخشی :

بسیاری از کودکانی که بیماری آن ها به موقع تشخیص داده شده و درمان شده اند با اقدامات باز پروری ، فیزیوتراپی ، گفتار درمانی و کار درمانی توانسته اند زندگی عادی و طبیعی داشته باشند .




مددجوی عزیز:

این پمفلت شامل اطلاعاتی در مورد بیماری فرزند شما است که رعایت آنها به بهبودی وی کمک می کند. امیدواریم با رعایت نکات ذکر شده در آن سلامت کودک دلبندتان را بازیابید.



هیدروسفالی:

به شرایطی گفته می شود که مایعات در داخل جمجمه تجمع کرده و باعث ورم کردن مغز می شود در واقع در لغت به معنی آب در مغز است که می تواند به مغز آسیب برساند و منجر به ناتوانی ها و اختلالات رشدی ، فیزیکی و ذهنی در بیمار شود. از هر هزار نوزادی که متولد می شوند یک تا دو نفر به بیماری هیدروسفالی مبتلا هستند افزایش بیش از حد مقدار مایع مغزی نخاعی باعث می شود که فشار بیش از حدی به بافت مغز وارد شود و به بافت مغز آسیب وارد کند .



علل:

هیدروسفالی در بعضی از موارد قبل از تولد نوزاد شروع می شود در این حالت علت آن میتواند موارد زیر باشد .

◆ نقص مادر زادی که در اثر آن ستون فقرات به طور کامل بسته نمی شود .

◆ اختلال ژنتیکی

◆ عفونت های خاصی از قبیل سرخچه که در دوران بارداری اتفاق می افتد .

◆ عفونت دستگاه عصبی مرکزی از قبیل مننژیت به ویژه در نوزادان

◆ خونریزی در مغز در زمان زایمان با به فاصله کوتاهی بعد از آن ، به ویژه در نوزادانی که نارس به دنیا می آیند .

عوامل تاثیر گذار در هیدروسفالی نوزادان عبارتند از:

- وزن تولد کمتر از ۱۵۰۰ گرم
- زودرس (سن حاملگی ۳۰ هفته)
- دیابت مادران
- وضعیت اجتماعی و اقتصادی کم
- جنسیت مرد
- نژاد (خطر در آسیا کاهش می یابد)

اولین نشانه های هیدروسفالی در نوزادان:

۱- برآمدگی روی ملاج یا نقاط نرمی در روی سطح جمجمه

۲- افزایش سریع اندازه دور سر

۳- تشنج

۴- خواب آلودگی زیاد

۵- شیر خوردن کم

۶- ثابت شدن چشم ها به طرف پایین

