





آموزش به بیمار

پورت



بیمارستان آموزشی، پژوهشی،
درمانی شهید هاشمی نژاد مشهد
واحد آموزش به بیمار

بخیه هایی که بر روی پوست زده می شود ، بعد از
معاینه و اجازه جراح، معمولاً یک هفته تا ۱۰ روز بعد
قابل کشیدن هستند.



منابع: www.uptodate.com /

مشهد، طلاب، انتهای بلوار ابوریحان، بیمارستان شهید هاشمی نژاد

تلفن: ۱۵-۱۱-۲۷۳۷۰۱۳۰ و یا شماره ۳۱۰۹

داخلی بخش انکولوژی ۸۳۱۴

سایت بیمارستان: hasheminejad.mums.ac.ir

کلینیک پرستاری آموزش سلامت واقع در کلینیک تخصصی همه روزه
به جز ایام تعطیل از ساعت ۸ الی ۱۲ پاسخگوی سوالات شما می
باشد تلفن داخلی کلینیک ۸۰۰۳ می باشد. جهت دریافت پمفلت ها و
فیلم های آموزشی بارکد های زیر را اسکن کنید.



در آپارات ما را
دنبال کنید

نحوه جاگذاری پورت

پورت گذاری توسط جراح انجام می شود. فرآیند جاگذاری ،
بسیار ساده ، کم خطر و ایمن است. جراح و تیم بیهوشی
قبل از پورت گذاری ، وضعیت سلامتی بیمار را با دقت
ارزیابی می کنند و در اتاق عمل جاگذاری انجام می
شود. در بسیاری از بزرگسالان این عمل حتی نیاز به
بیهوشی ندارد و با یک بی حسی موضعی قابل انجام
است. پس از جاگذاری ، عکس رادیولوژی از ناحیه گرفته
می شود تا از جاگذاری صحیح اطمینان حاصل شود

نحوه استفاده از پورت

جهت استفاده از پورت ، سوزنهای مخصوص با اندازه ، قطر
و اشکال متنوع وجود دارد. هر چند در شرایط اضطرار
استفاده از سوزنهای معمولی اشکالی ندارد ، اما بهتر است
از سوزنهای مخصوص پورت استفاده شود ، این کار به دوام
پورت کمک می کند.





پورت روشی مطمئن برای تزریقات وریدی

استفاده از رگهای محیطی جهت کمو تراپی و دارو درمانی در طولانی مدت موجب عوارضی مثل:

- ← سستی و شکنندگی دیواره رگها می شود
- ← محدودیت در استفاده از رگ های دست و پا. مثلاً خانمی که مبتلا به بد خیمی پستان دو طرفه است ، بعد از جراحی استفاده از رگ گیری های دست ممنوع است
- ← نوزادان و اطفال را ، استفاده طولانی از رگهای محیطی دچار مشکل می کند.
- ← افزایش احتمال التهاب مسیر رگ محیطی
- ← برخی از داروهای شیمی درمانی موجب تغییر رنگ و سفتی (طنابی شدن) دائمی مسیر رگ گیری می شوند

بنابراین این سوال پیش می آید که آیا روش دیگری برای انجام شیمی درمانی وریدی وجود ندارد؟

جواب : بله استفاده از پورت

آشنایی با پورت

پورت از ابزارهای دستیابی به ورید های مرکزی است. این وریدها بر خلاف وریدهای محیطی ، در زیر پوست قابل مشاهده و لمس نیستند و قطری به مراتب بیشتر دارند. در تمام بدن چنین وریدهایی وجود دارند، اما رایجترین و متداولترین آنها در ناحیه ترقوه و قلب جهت پورت گذاری استفاده می شوند. از پورت می توان در کلیه تزریقات وریدی و نمونه گیری از خون استفاده کرد.



مزایای پورت

- این وسیله در خانمهای مبتلا به بد خیمی دو طرفه پستان که تحت جراحی قرار گرفته اند و تمام کسانی که برنامه درمانی طولانی مدت وریدی دارند ، می توانند با پورت گذاری ، برای همیشه از رگ گیری های مکرر رهایی یابند.
- کودکان و نوزادان مبتلا به کانسر ، اغلب رگهایی ظریف و آسیب پذیر دارند ، رگ گیری های پیاپی حتی روی خلق و خوی این گروه از بیماران تاثیر منفی می گذارد ، پورت ضمن تامین امنیت لازم برای انجام تزریقات و خونگیری ، در کاهش استرس های کودک نقش بسزایی دارد.

تصمیم گیری نهایی بر عهده پزشک معالج (انکولوژیست) است.

معایب پورت

- ① بسته شدن مسیر کاتتر ، تشکیل لخته
- ② تاخوردگی و پیچ خوردگی مخزن
- ③ مشکلات عفونی
- ④ گاهی برخی بیماران ، از جدا شدن محفظه کاتتر در نتیجه فعالیت های روزانه نگران هستند ، که احتمالش بسیار ضعیف است.

اجزاء پورت

پورت دارای محفظه ای فلزی یا پلاستیکی است که در قفسه سینه جا گذاری می شود. سائز محفظه های موجود در بازار متفاوت است و با توجه به جثه و سن بیمار انتخاب می شود.

روی محفظه را غشایی سیلیکونی و نرم پوشانده است که مرکز آن محل ورود سوزن پورت می باشد. این مجموعه در نهایت به کاتتری (لوله ای) از جنس پلی اورتان متصل می شود که انتهای دیگر آن در داخل عروق مرکزی قرار می گیرد.

