

معیارهای ارزیابی هوشیاری در بیماران

معیار ارزیابی		معیار	معیار در کودکان
AVPU	Alert	A	کودک هوشیار و با پرستار ارتباط برقرار می کند
	Responsive to Verbal	V	(لتارژی) کودک به صدای بلند پرستار پاسخ می دهد
	Responsive to Pain	P	(استوپور) کودک به محرک دردناک پاسخ می دهد
	Unresponsive	U	(کما) کودک به هیچ محرکی پاسخ نمی دهد
نقاط محرک درد		بستر ناخن-جناغ سینه-بالای حدقه چشم-عضله ذوزنقه ای	

معیار ارزیابی		نمره	تا یکسالگی	از ۱ تا ۵ سال	بزرگسال
Eye		۱	بدون پاسخ	بدون پاسخ	بدون پاسخ چشمی
		۲	با تحریک دردناک	با تحریک دردناک	با تحریک دردناک
		۳	با صدا زدن	با درخواست کلامی	در واکنش به صدا
		۴	خودبخودی	خودبخودی	خودبخودی
Verbal		۱	بدون پاسخ	بدون پاسخ	بدون پاسخ کلامی
		۲	نالہ کردن	گریه	اصوات مبهم
		۳	گریه با تحریک دردناک	تولید صدا	کلمات نامفهوم و بی ربط
		۴	گریه	کلمات نا مرتبط	گیجی و عدم آگاهی به مکان و زمان
		۵	گریه یا خنده بچگانه	پاسخ درست	هوشیار
Motor		۱	بدون پاسخ	بدون پاسخ	بدون پاسخ حرکتی
		۲	بازنمودن اندام	اکستانسیون در برابر درد	اکستانسیون غیر طبیعی
		۳	خم کردن غیر طبیعی	فلکسیون در برابر درد	فلکسیون غیر طبیعی
		۴	دور نمودن از محل درد	دور نمودن از محل درد	دور نمودن از محل درد
		۵	تشخیص محل درد	تشخیص محل درد	تشخیص محل درد
		۶	حرکات خودبخودی طبیعی	اجرای دستورات	اجرای دستورات

دسته بندی صدمات مغزی	GCS<۸: آسیب شدید	GCS=۹-۱۲: آسیب متوسط	GCS>۱۳: آسیب خفیف
----------------------	------------------	----------------------	-------------------

RASS (بیماران تحت سدیشن)

+۴	+۳	+۲	+۱	۰	-۱	-۲	-۳	-۴	-۵
پرخاشگر	بسیار بی قرار	بی قرار	نا آرام	هوشیار و آرام	خواب آلود	سبک	متوسط	Sedation عمیق	بدون پاسخ
معیار ارزیابی		نمره / نشانه	پاسخ چشمی	پاسخ حرکتی	رفلکس های ساقه مغز	وضعیت تنفسی	Four Score		
		۰	باز نکردن پلک با محرک دردناک	عدم پاسخ به محرک دردناک	رفلکسهای مردمک، قرنیه و رفلکس سرفه وجود ندارد	تحت ونتیله با تعداد تنفس تنظیمی -وجود آپنه			
		۱	باز کردن پلک ها با محرک دردناک	اکستانسیون با تحریک دردناک	رفلکسهای مردمک و قرنیه وجود ندارد	تحت ونتیله با تعداد تنفس بالاتر از تنظیم			
		۲	باز کردن چشم با صدای بلند	فلکسیون با تحریک دردناک	رفلکسهای مردمک یا قرنیه وجود ندارد	تنفس نامنظم			
		۳	باز کردن چشم بدون دنبال کردن یا پلک زدن	لمس دست معاینه کننده بعد از تحریک دردناک	یک مردمک گشاد و فیکس است	تنفس شین استوک			
		۴	باز کردن چشم و دنبال کردن یا پلک زدن	مشت کردن یا بالا آوردن شصت با دستور	وجود واکنشهای مردمک و قرنیه	تنفس منظم			